

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS

Année 1955

N°

423

T H E S E

pour le

DOCTORAT EN MEDECINE

(Diplôme d'Etat)

par

DUBOURG François

né le 17 février 1926

à Paris XVe

Présentée et soutenue publiquement le

1955

CONTRIBUTION À L'ETUDE DU TRAITEMENT DES TUBERCULOSES
GANGLIONNAIRES EXTERNES. RECHERCHES SUR LE TRAITEMENT
PAR LA CORTISONE ET L'HYDROCORTISONE.

Président : M. Julien MARIE, Professeur
D'ACTYLOGRAPHIE

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS

Année 1955

N°

T H E S E
pour le
DOCTORAT EN MEDECINE
(Diplôme d'Etat)

par
DUBOURG François
né le 17 février 1926
à Paris XVe

Présentée et soutenue publiquement le 1955

CONTRIBUTION A L'ETUDE DU TRAITEMENT DES TUBERCULOSES
GANGLIONNAIRES EXTERNES. RECHERCHES SUR LE TRAITEMENT
PAR LA CORTISONE ET L'HYDROCORTISONE.

Président : M. Julien MARJE, Professeur

Dactylographiée



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA40153726_0052

DOYEN HONORAIRE :
M. BAUDOUIN

PROFESSEURS HONORAIRES :

MM. BAUDOUIN, BRINDEAU, CADENAT, CARNOT, CHABROL, CHEVASSU,
CHIRAY, CLERC, DELBET, GOUGEROT, GUILLAIN, HARVIER, LAUBRY,
LEMAITRE, LEMIERRE, LHERMITTE, LIAN, LOEPER, MARION, MATHIEU,
MOCQUOT, MULON, OLIVIER, OMBREDANNE, SANNIE, SEZARY, TANON.

DOYEN Léon BINET
ASSESEUR Jean VERNE

1°) PROFESSEURS

Anatomie	CORDIER (G)
Anatomie Pathologique	DELARUE (P)
Bactériologie	GASTINEL (P)
Biologie appliquée à l'Education physique et aux sports	CHAILLEY-BERT
Biologie médicale	VERNE (J)
Cancérologie médicale et sociale	HUGUENIN (R)
Carcinologie	OBERLING (C)
Chimie médicale	POLONOVSKI (M)
Hôtel-Dieu	BROCQ (P)
Cliniques Chirurgicales	DE-GAUDART-D'ALLAINES (J)
Broussais	MONDOR (H.)
Salpêtrière	QUENU (J)
Cochin	MERLE-D'AUBIGNE
Clinique chirurgicale réparatrice et orthopédique	DONZELOT (E.)
Clinique de cardiologie	FEVRE (M)
Clinique de chirurgie infantile et d'orthopédie	MONOD (R)
Clinique de chirurgie pleuro-pulmonaire	BERNARD (E)
Clinique de la tuberculose	PETIT-DUTAILLIS (J)
Clinique de neuro-chirurgie	LELONG (M)
Clinique de puériculture	DEGOS (R.)
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques	CHEVALLIER (P)
Clinique des maladies du sang	ALAJOUANINE (J)
Clinique des maladies du système nerveux	DEBRE (R)
Clinique des maladies des enfants	MOLLARET (P)
Clinique des maladies infectieuses	DELAY (J)
Clinique des maladies mentales et de l'encéphale	BENARD (H)
Hôtel-Dieu	LAROCHE (G)
Cliniques médicales	MOREAU (R)
Bichat	DE GENNES (J)
Cochin	JUSTIN-BESARON
Broussais	FUTCY-BRENTANO
Clinique médicale d'hydro-climatologie thérapeutique	PASTEUR VALLERY-ROGEE
Clinique gynécologique	BOULIN (R)
Clinique médicale propédeutique	LANTUEJOU (P)
Clinique médico-sociale du diabète sucré et des maladies de la nutrition	LEVY-SOLAL (J)
Tarnier	LACOMME (M)
Cliniques obstétricales	VELTER (E)
Baudelocque	AUBIN (A)
Port-Royal	RICHET (C)
Clinique ophtalmologique	HEUYER (C)
Clinique oto-rhino-laryngologique	COSTE (F)
Clinique physio-pathologique des problèmes alimentaires (chaire à titre personnel)	DECHAUME (M)
Clinique psychiatrique infantile	
Clinique rhumatologique et sociale	
Clinique Stomatologique	

Clinique thérapeutique chirurgicale	SENEQUE (J)
Clinique thérapeutique médicale	LEMAIRE (A)
Clinique urologique	FEY (B)
Embryologie	GIROUD (A)
Génétique	LAMY (M)
Histoire de la médecine et de la chirurgie . .	MOUQUIN (M)
Histologie	CHAMPY (C)
Hygiène et clinique de la première enfance .	CATHALA (J)
Hygiène et médecine préventive	JOANNON (G)
Médecine du Travail	DESOILLE (H)
Médecine légale	PIEDELIEVRE (H)
Parasitologie et histoire naturelle médicale .	GALLIARD (H)
Pathologie chirurgicale	MENEGAUX (G)
Pathologie exotique	LAVIER (G)
Pathologie expérimentale et comparée	LENEGRE (J)
Pathologie humorale et immunologie expérimentale	MERKLEN (F.P.)
Pathologie médicale	BARIETY (M)
Pathologie et thérapeutique générales	GARCIN (J)
Pédiatrie Sociale	MARIE (J)
Pharmacologie et matière médicale	HAZARD (R)
Physico-chimie médicale (chaire à titre personnel)	DOGNON (A)
Physiologie	BINET (L)
Physique médicale	STROHL (A)
Radiologie médicale	DESGREZ (H)
Technique chirurgicale	MOULONGUET (P)
Thérapeutique	TURTIN (R)

2°) PROFESSEURS SANS CHAIRE

MAITRES DE CONFERENCES-AGREGES ET AGREGES

	MM.			MM.
Anatomie	(DEBEYRE (J)	:		(HUGUIER (J)
	(DELMAS (A)	:		(LAURENCE (G)
	(N...	:		(LEGER (L)
	(Gauthier-VILLARS	:		(LORTAT-JACOB
Anatomie patho-	(Melle P. Pr.s.ch.	:	Pathologie	(OLIVIER (Cl)
logique.....	(BUSSER (F)	:	Chirurgicale . . .	(PADOVANI (P)
	(GOUYGOU (C)	:		(POILLEUX (M)
	(PASQUELLE (R)	:		(ROUX (M)
Bactériologie . .	(NEVOT (A)	:		(RUDLER (JC)
		:		(VERNE (JM)
Biologie Médicale.	BOURLIERE (F)	:	Pathologie expé.	N...
	(ETTORI (J) Pr.s.ch	:		(BERNARD (J)
Chimie médicale .	(JAYLE (MF) Pr.s.ch	:		(BOUDIN (G)
	(SCHAPIRA (G)	:		(CASTAIGNE (P)
Dermato-Syphili-	DUPERRAT (F)	:		(Conte (M)
graphie		:		(DECOURT (J)
	(BULLIARD (H)	:		(DOMART (A)
Histologie . . .	(COUJARD (R)	:		(DREYFUS (G)
	(N...	:		(FAUVERT (P)
		:	Pathologie	(HAMBURGER (J)
Hydrologie . . .	DEBRAY (C)	:	Médicale	(KOURILSKY (R)
	(BOYER (J)	:		(LAMOTTE (M)
Hygiène	(DEPARIS (M)	:		(LAROCHÉ (C)
		:		(MILLIEZ (P)
	(DEROBERT (L)	:		(PEQUIGNOT (H)
Médecine légale	(GAULTIER (M)	:		(FERRAULT (M)
du Travail	(HADENGUE (A)	:		(FANBERT (L)

Neurochirurgie . . .	MM. DAVID (M)	:			(JOSEPH (S))
Neurologie	SEZE (S. de)	:	Pédiatrie		(LAPLANE (R))
	(GRASSET (J))	:			(N...)
	(LEPAGE (F))	:			
	(MAYER (M))	:	Pharmacologie . .		(LEVY (Melle))
Obstétrique . . .	(MERGER (R))	:			(CHEYMOL (JH))
	(MORIN (P))	:			
	(RAVINA (J))	:	Physiologie . . .		(BARGETON (J))
	(VARANGOT (J))	:			(PARROT (JL))
		:			
Ophtalmologie . .	(OFFRET (G))	:	Physique médicale		(DJOURNO (J))
	(DESVIGNES (P))	:			(GOUGEROT (J))
		:	Pneumo-Phtisiologie		KREIS (B)
Orthopédie	JUDET (R)	:	Psychiatrie infantile		MICHAUD (J)
	(HALPHEN (E))	:			
Oto-rhino-laryngo-	(AUBRY (M))	:	Stomatologie . . .		(CERNEA (P))
logie	(MADURO (R))	:			(CHAPUT (Mme))
		:	Thérapeutique . .		FERRAULT (J)
Parasitologie . . .	(BRUMPT (L))	:	Urologie		KUSS (R)
	(CHABAUD (A))	:			
	(ABOULKER (P))	:			
Pathologie Chirur-	(BAUMANN (J))	:			
gicale	(GOSSET (J))	:			

3°) PROFESSEURS HONORAIRES ET AGREGES
RAPPELES A L'EXERCICE POUR LE SERVICE DES EXAMENS

MM. BRINDEAU (A) (Obstétrique), GATELLIER (J) (Clinique Chirurgicale), LE LORIER (V), (Obstétrique), VAUDESCAL (R) (Obstétrique)

4°) PROFESSEURS SANS CHAIRE ET AGREGES
CHARGES DE COURS DE CLINIQUE ANNEXE A TITRE PERMANENT

	MM.	:		MM.
Clinique	(AMELINE (A))	:		(HAGUENAU (M))
Chirurgicale . . .	(PATEL (J))	:	Clinique médicale	(MARCHAL (G))
	(SICARD (A))	:		(SOULIE (E))
		:		
Clinique médicale.	(BROUET (G))	:	Clinique obsté-	ECALLE (G)
	(CACHERA (R))	:	tricale	
		:		
		:	Clinique Ophtalmo-	
		:	logique	RENARD (G)
		:		
		:	Clinique urologique	COUVELAIRE
Secrétaire général de la Faculté		:		
Secrétaire		:	MOREL (J)	
		:	Melle CHAINTREUIL (G)	

Conservateur, chargé de la direction Docteur HAHN (A)
Conservateur Melle GOICHON
Bibliothécaires (Melles DUMAITRE (P), LE NOIR (G)
(METIN (F), QUIEVREUX (E))

À Monsieur le Docteur JULIEN SARRIS

Professeur de la chaire de Pédiatrie Sociale

Médecin des Hôpitaux

Chevalier de la Légion d'Honneur

qui m'a fait le grand honneur d'accepter la
présidence de cette thèse. Hommage de ma respectueuse
reconnaissance.

A mes maîtres des Hôpitaux

A mes maîtres à l'Université de l'Hôpital SAINT-JACQUES

Les Docteurs BRILLARD et ROISIN

Les Docteurs LEGRAND et GIRAULD

qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde
gratitude pour l'enseignement qu'ils m'ont prodigué et
la bienveillante sympathie qu'ils m'ont témoignée.

A mes Parents

avec ma profonde affection et ma reconnaissance

A ma Mère

l'expression de mon amour et de ma gratitude pour
l'aide qu'elle m'a apportée dans ce travail.

A mes Beauv-Parents

A toute la famille

A mes amis.

Connue dès l'Antiquité, la tuberculose ganglionnaire externe a une histoire thérapeutique des plus colorées. Les porteurs de "écrouelles", reliquat inesthétique de l'évolution spontanée de cette affection, n'eurent pour leur espoir pendant plus de six siècles, que celui de voir advenir sur eux un souverain seigneur qui comptait au nombre de ses privilèges celui de pouvoir guérir ses vassaux par imposition des mains. Cette thérapeutique amène ainsi avec elle une faveur indiscutable, certains monarques ayant eu affluer sur leurs des chroniqueurs plus de dix mille malades par an.

Il n'est qu'au milieu du siècle dernier que médecins et chirurgiens commencent à en préciser le diagnostic et le traitement, et, bien que rencontrée aujourd'hui avec une fréquence moindre, la tuberculose ganglionnaire externe reste du domaine de la pratique médicale courante et soulève encore de nombreuses difficultés.

Nous commencerons ici par les problèmes thérapeutiques en rappelant en premier lieu les différentes méthodes de traitement utilisées avant l'ère des antibiotiques spécifiques, et nous analyserons en second lieu les résultats obtenus par ceux-ci. Dans une troisième partie nous signalerons l'apport thérapeutique nouveau que constitue

Les conditions matérielles de la vie sociale ont une influence déterminante sur l'évolution de la culture. C'est pourquoi, pour comprendre l'histoire d'une civilisation, il faut étudier les conditions de son existence matérielle. Cette étude se divise en deux parties : l'étude des conditions de la vie matérielle elle-même, et l'étude de l'influence de ces conditions sur la culture. La première partie est la plus importante, car elle constitue la base de toute l'édifice culturel. Elle se divise à son tour en deux sous-parties : l'étude des conditions de la vie matérielle elle-même, et l'étude de l'influence de ces conditions sur la culture. La seconde partie est la plus délicate, car elle nécessite une connaissance approfondie de la culture elle-même. Elle se divise à son tour en deux sous-parties : l'étude de l'influence des conditions matérielles sur la culture, et l'étude de l'influence de la culture sur les conditions matérielles. Cette étude est d'une importance capitale, car elle permet de comprendre les causes profondes des transformations sociales et culturelles. Elle est aussi la plus difficile, car elle nécessite une approche pluridisciplinaire, impliquant la connaissance de l'économie, de la sociologie, de l'histoire, de la philosophie, etc. C'est pourquoi, dans ce chapitre, nous nous limiterons à l'étude des conditions de la vie matérielle elle-même, et nous laisserons à d'autres chapitres la tâche de l'étude de l'influence de ces conditions sur la culture.

La culture semble tenir davantage aux conditions de la vie matérielle qu'on ne le croit généralement. C'est pourquoi, dans ce chapitre, nous nous limiterons à l'étude des conditions de la vie matérielle elle-même, et nous laisserons à d'autres chapitres la tâche de l'étude de l'influence de ces conditions sur la culture.

marine qu'à l'héliothérapie, ces méthodes plus rapides et plus nombreuses étant moins sujettes à l'écoulement de l'hiver, où les gelées sont exposées aux vents violents et aux embruns.

Avant la découverte et l'application des antibiotiques, de nombreux traitements adjuvants ont été préconisés et parmi ceux-ci nous ne ferons que rappeler les préparations iodées, les préparations arsenicales telles la liqueur de Fowler, l'arrhénal, les préparations à base de sels d'or, l'huile de foie de morue, puis les produits à base de cholestérol irradiés ont servi d'adjuvant aux cures climatiques ou physiothérapiques.

Certaines méthodes vaccinothérapiques connaissent également une certaine faveur, tel l'emploi de l'antigène méthylique de vacco de Vaudremer, l'allergine de Jousset, la tuberculine, la thérapie difficilement maniable.

En dehors de ces méthodes aujourd'hui abandonnées, il faut rappeler l'emploi plus récent de deux produits dont l'activité mérite une étude plus approfondie.

L'huile de Chauliogra, employée depuis longtemps dans le traitement de la lèpre, a été appliquée à celui de la tuberculose ganglionnaire externe en raison de la similitude entre le bacille de Hansen et le bacille de Koch et par son action "in vitro" confirmée dès 1930 par les travaux de Valier et Sweeney. Son utilisation en clinique

malade, après de nombreuses injections intraveineuses, il semble que l'effet thérapeutique de l'ampicilline soit dû à une action directe sur le microbe, celle-ci ne s'oppose à la destruction du bacille de Koch dont la sensibilité vis-à-vis de la streptomycine ne semble pas sensiblement augmentée par l'action lytique de l'ampicilline. Par ailleurs, la streptomycine-résistance semble être diminuée par l'association des deux produits. Facilement applicable, en injections intra-veineuses, bien tolérée dans la plupart des cas, cette thérapeutique semble avoir donné de bons résultats dans de nombreux cas observés en Tunisie par J. Saillard dans sa thèse de 1952.

L'emploi de l'hypérite à l'azote, ou rouleau à l'azote, a fait l'objet également de nombreux travaux réalisés, en France en particulier, par le Professeur Chevallier. Dérivé chloré de la triéthylamine, la rouleau à l'azote possède une action cytotoxique marquée sur les tumeurs en prolifération, se rapprochant de l'action myéloblastique des rayons X. Son application en clinique humaine pose quelques difficultés, car ce produit, très actif et irritant pour les tissus, ne peut être administré que par voie strictement endo-veineuse, par l'intermédiaire d'une perfusion de sérum, posée au préalable. De plus, son

activité cytolytique est à l'origine d'accidents sanguins qui peuvent être graves en dehors d'une surveillance médicale stricte. On observe en effet des altérations constantes de la formule sanguine au cours du traitement et, en particulier, une baisse notable de la leucocytose portant surtout sur les lymphocytes. La possibilité d'accidents sanguins tardifs justifie une surveillance prolongée de la formule sanguine.

Cette méthode de traitement semble avoir donné de bons résultats dans les formes graves, polyfistuleuses, rebelles aux traitements usuels, et dans les formes accompagnées d'une importante réaction péri-ganglionnaire, l'action anti-inflammatoire et stimulatrice du système réticulo-endothélial de la moutarde à l'azote semblant trouver ici son meilleur champ d'action.

A côté du traitement médical que nous venons de rappeler dans ses grandes lignes, il nous faut étudier maintenant les méthodes physiothérapiques qui ont donné lieu à de nombreux travaux et à de nombreux succès thérapeutiques. Nous citerons essentiellement la Roentgenthérapie et l'utilisation des rayons ultra-violeta en insistant tout d'abord sur le fait que ces méthodes ne sont pas à opposer, le traitement par ultra-violeta complétant le plus souvent le traitement radiothérapique.

En effet, les modes d'action de ces deux méthodes sont

très caractéristique : les bacilles de Koch possèdent une propriété propre par la bacille de Koch, qui est la destruction de celui-ci par modification du milieu où vivent les bacilles. Les modifications des caractères bio-chimiques des tissus favorisent en augmentant la vie propre des bacilles, augmentation de la phagocytose favorisant leur élimination, action destructive intense détruisant le tissu lymphoïde et faisant disparaître les bacilles du ganglion dans son ensemble.

Les rayons ultra-violets ont une action bactéricide sur le bacille de Koch et agissent de façon plus générale, le métabolisme cellulaire. Mais en clinique humaine, l'emploi des radiations ultra-violettes se limite aux radiations dites moyennes, dont les longueurs d'onde sont comprises entre 0,25 μ et 0,28 μ , correspondant aux rayons actifs de la lumière solaire. Or, les longueurs d'onde des rayons ultra-violettes ont une pénétration très restreinte dans l'épiderme, celle-ci s'arrêtant classiquement à la surface de la peau, et l'action obtenue n'est que très générale, se traduisant dans les cas favorables par une amélioration sensible de l'état général des patients tuberculeux.

De nombreuses critiques ont jeté le discrédit sur le traitement de celles-ci par les rayons γ en particulier.

éviter les dangers auxquels on s'expose en traitant le patient. Il semble, d'après les travaux de F. Langerhans et en particulier, que l'observation de certaines règles évite de façon quasi absolue les accidents. Il s'agit de rayonnements moyennement pénétrants, à des doses de 2500 r par séance, filtrées par 2 à 10 milligrammes de vinyle selon les sujets. Les séances seront espacées de 7 à 15 jours, le nombre total de séances étant de 3 à 12. Un repos de 4 à 5 semaines séparera deux séries de traitement. Les accidents seront évités par une surveillance locale attentive, toute modification des symptômes devra faire diminuer ou espacer les doses.

Les mêmes précautions seront prises dans l'application des ultra-violets qui sera contre-indiquée chez les sujets porteurs de lésions tuberculeuses pulmonaires, de lésions rénales aiguës, ou de cardiopathies décompensées. L'irradiation sera pratiquée sur l'ensemble du corps du sujet, de façon progressive dans la durée des séances qui seront répétées en moyenne trois fois par semaine, par séries de 10 à 15 séances. Seront justiciables de ce traitement par les ultra-violets les micropolyadénopathies et les adénopathies fibreuses, et, de façon plus large, les formes s'accompagnant d'une altération notable de l'état général qui bénéficient le plus souvent de ce traitement adjuvant. La radiothérapie trouve son indication de choix dans les adénites de constitution récente, à évolution clinique torpide. Les cas de ramollissement ou

de fistulisation il est indispensable de pratiquer au préalable l'évacuation du ganglion.

Appliqué dans ces conditions, le traitement radiothérapique compte de nombreux succès. Sur 65 cas Bray et Boijean notent 28 guérisons totales et 21 améliorations indiscutables. Uehara cite 70% de guérisons sur 140 cas traités. Lange et Chast ont 84% de guérisons sur 37 cas. Il est à noter enfin que l'efficacité du traitement radiothérapique peut être apprécié après quelques semaines, les formes ne réagissant pas d'emblée étant peu susceptibles de s'améliorer par la suite.

Le traitement chirurgical qui semble devoir réaliser par l'excision du ganglion ou de groupe ganglionnaire atteint la méthode la plus rapide et la plus efficace, a connu des alternances de faveur et de défaveur plus ou moins justifiées. Il y a quelques années, en particulier, on reprochait à la chirurgie de la tuberculose ganglionnaire externe la constitution de cicatrices souvent étendues et prenant facilement un aspect chéloïdien, la relative fréquence de lésions nerveuses portant en particulier sur la branche sous-mandibulaire du nerf facial, l'observation fréquente de récidives ganglionnaires, et, surtout, le risque permanent d'une dissémination tuberculeuse.

partir du foyer d'infection.

Ces dernières années ont vu un nombre considérable de
trésoristiques chirurgicales qui rendent la tâche du chirurgien
plus les auteurs anglo-américains qui ont proposé l'excision
extensive des ganglions de l'axillaire - ainsi que les
H. Miller, Swenson et Small, J. Bone, proposent l'excision
d'un ganglion isolé ou d'un groupe de ganglions
isolés, après une incision axillaire courbe ou
transversale, ou, dans certains cas, une extirpation
large et élective de tous les ganglions palpables et
visibles sans réaliser l'évidement complet des chaînes
ganglionnaires axillaires. Cette œuvre a été
réalisée sous une anesthésie générale d'urgence ou
pour éviter une chirurgie dangereuse aux enfants. Le
com, et le drainage post-opératoire sera prescrit, car
c'est là un des éléments responsables des fistules
secondaires. Le choix du moment de l'intervention varie
selon les auteurs dont la plupart préfèrent cependant
pratiquer l'excision de ganglions au stade de croûte, ou,
tout au moins, après refroidissement d'une adénite
Swenson et Small pratiquent l'excision des ganglions
isolés par une incision elliptique englobant la
fistule et les tissus qui l'entourent, et semblent avoir
obtenu là aussi d'excellents résultats. Tous les auteurs

Dans ces conditions, les critiques rapportées plus haut
semblent perdre de leur acuité, mais il reste cepen-
dant la possibilité de constitution de cicatrices inesthé-

la suprématie absolue de ce traitement.

générale chez les auteurs anglo-saxons, à considérer

gestes essentiels à pratiquer avant le traitement
gical. Ceci semble résulter du fait que ces auteurs
considèrent que, dans les localisations cervicales,
porte d'entrée principale est réalisée par une lési-

(22 %) ou dentaire (12 %). Certains praticiens
et allemands ont même préconisé l'amygdalectomie com-
me seul traitement des adénites cervicales tuberculeuses
c'est ainsi que Von Hasler et Weder rapportent
statistique portant sur 188 malades traités entre 1941
et 1950, et, en particulier, 24 cas traités par cette même
méthode ont vu quelques guérisons complètes et quelques
améliorations très sensibles.

Sans entrer dans des discussions pathogéniques qui
tranchent de reste par le grand nombre de cas

Enfin, par un examen de façon systématique l'analyse des
données cliniques et des données de laboratoire nous
prouve que lorsque les lésions sont localisées dans les
organes, elles doivent être traitées par des moyens
spécifiques, ou le cas échéant, par des moyens
généralistes.

En outre, de l'examen, on peut relever les traits
caractéristiques de certaines lésions, telles que les
lésions de type tuberculeux ou de type fongique, ou
un certain nombre de lésions de type bactérien, ou
de type viral, ou de type parasitaire.

Enfin, par un examen de la littérature, nous pouvons
établir que les lésions de type tuberculeux, de type
fongique, de type bactérien, de type viral, ou de type
parasitaire, sont traitées par des moyens spécifiques, ou
le cas échéant, par des moyens généralistes. Cette méthode
nous a permis de classer les lésions de type tuberculeux, de
type fongique, de type bactérien, de type viral, ou de type
parasitaire, en fonction de leur traitement.

Enfin, nous avons vu que les lésions de type tuberculeux,
de type fongique, de type bactérien, de type viral, ou de
type parasitaire, sont traitées par des moyens spécifiques,
ou le cas échéant, par des moyens généralistes. Cette méthode
nous a permis de classer les lésions de type tuberculeux,
de type fongique, de type bactérien, de type viral, ou de
type parasitaire, en fonction de leur traitement.

Enfin, nous avons vu que les lésions de type tuberculeux,
de type fongique, de type bactérien, de type viral, ou de
type parasitaire, sont traitées par des moyens spécifiques,
ou le cas échéant, par des moyens généralistes. Cette méthode
nous a permis de classer les lésions de type tuberculeux,
de type fongique, de type bactérien, de type viral, ou de
type parasitaire, en fonction de leur traitement.

L'apparition successive, au cours de ces dernières années, de nombreux antibiotiques à activité spécifiquement tuberculeuse et leur succès dans les diverses formes de la maladie tuberculeuse, ont fait espérer une révolution thérapeutique dans le traitement de la tuberculose ganglionnaire externe. Il semble, après quelques années de succès et de déceptions, que l'efficacité de ces antibiotiques, dans le traitement de la tuberculose ganglionnaire externe, ne soit pas aussi grande qu'il y avait lieu de l'attendre. Les streptomycines, en premier lieu, employées par voie générale, se sont révélées à de nombreuses occasions, dans les observations d'Alfred Bernard, Fouquet, A. Jarry, comme rapportées au cours d'une évolution lente d'adénopathie trachéobronchique chez des malades porteurs de tuberculose pulmonaire traitée par la streptomycine, soit sans la moindre amélioration, soit avec l'aggravation progressive, entraînant gravement sur l'état général. En dehors de l'intensité de l'infection locale, ces auteurs notent une streptomycine-résistance relative des bacilles de Koch retrouvés dans les ganglions. L'insuccès de la streptomycine dans ces formes bacillifères et rapides

caséifiante qui sont à rapprocher des adénopathies satellites des abcès d'inoculation, viendrait pour Bernard à la pauvreté de la vascularisation ganglionnaire et à l'imperméabilité du cœlum à l'antibiotique. S'opposent à ces forces, les adénites isolées de l'enfance d'évolution plus lente, pauvres en germes, et surtout la lymphadénie tuberculeuse, semblent réagir de façon plus favorable à la streptomycine (Lerrierre, Collaret, Perchat.) La relative inefficacité, voire les dangers auxquels expose l'emploi de la streptomycine par voie générale, a fait préférer en général l'administration par voie locale surtout dans les formes suppurantes ou très fistulisées. Le succès local de la streptomycine apparaît lié pour G. L'aini, à la neutralisation ou à l'atténuation préalable du pus tuberculeux et dans ce but, l'auteur recommande le lavage de la cavité ganglionnaire par une solution stérile de citrate de soude à 3,8 %. Les autres auteurs pratiquent directement l'injection intra-ganglionnaire d'une solution de streptomycine, après évacuation du ganglion ramolli par ponction ou scion et observent dans de nombreux cas une diminution nette du volume du ganglion et l'absence de cicatrices inesthétiques ou de fistules (Bance et Vanni, Cocozza, Chibnert.) Quoiqu'il en soit, les résultats de cette thérapeutique

est indiquée et l'importance de l'usage
de l'acide iso-nicotinique et de l'acide
à propos de leur utilisation dans les
produits employés seuls ou associés entre eux.

L'acide para-aminosalicylique employé par voie
générale, semble indiquer une indication thérapeutique
valable dans les maladies infectieuses (Dowd et Dwyer, 1934)
principalement son emploi par voie locale. Sa technique
consiste en l'injection locale renouvelée, après lavage
de la plaie, d'une solution de para-aminosalicylate, et
l'application sur les lésions de solutions de même nature
à 20 % de même produit. Sous l'effet de ce traitement, on
peut constater une diminution de la réaction inflammatoire
et une disparition de la lésion initiale et un arrêt de la
propagation de la lésion. L'efficacité de
ce traitement dépend de la concentration locale
en acide para-aminosalicylique obtenue (voir tableau).
Quant à l'hydrazide de l'acide iso-nicotinique, son
emploi par voie générale, isolé, aurait quelques indications
(25 % de guérisons ou d'améliorations dans une statistique
lyonnaise récente) et pour A. Carpentier, serait un
traitement pré-opératoire intéressant, facilitant l'extirpation
du lymphome tuberculeux. Son application locale aurait
donné au même auteur des résultats intéressants dans la

différentes méthodes de traitement de la tuberculose
ganglionnaire externe. Sur 62 malades, un groupe de
d'entre eux traité sans antibiotiques montre un coeffi-
cient d'efficacité de 96 % (10 guérisons soit 48 % et 10
améliorations nettes soit 48 %). L'autre groupe com-
posé de 41 malades traités par les antibiotiques montre
un coefficient d'efficacité de 85,5 % (24 guérisons soit
58,5 % et 11 améliorations soit 27 %).

En résumé, il faut conclure, comme le font plusieurs
pour la plupart des auteurs, en recommandant de ne pas employer
les types systémiques des antibiotiques, et d'insister sur
l'emploi correct et prolongé d'un traitement local de la tuberculose
ganglionnaire externe.

III. LE TRAITEMENT PAR LA CORTISONE DE LA HYDROARTÉRIOSCLÉROSE

(Recherches personnelles)

L'application thérapeutique des hormones de la surrénale du groupe des glyco-corticoïdes dans les diverses manifestations de la maladie tuberculeuse, a été guidée par quelques notions que nous rappellerons brièvement. La tuberculose-maladie n'est pas seulement une contamination du bacille de Koch, mais aussi la réaction de l'organisme vis à vis de celui-ci et on retrouve avec une quasi-constance, une série de lésions inflammatoires non spécifiques, généralement pas influencées par les antibiotiques bactéricides ou bactériostatiques. Par ailleurs, il faut noter un ensemble de manifestations allergiques diverses liées à l'allergène tuberculeux. Or, l'apparition des hormones du groupe glyco-corticoïdes comportant la cortisone et la 17,hydro-cortisone ou l'hydrocortisone, permettait d'ajouter au traitement par les antibiotiques spécifiques, un élément puissant de lutte contre ces deux facteurs.

Le rôle très étendu des processus inflammatoires non spécifiques dans l'évolution des lésions tuberculeuses a été précisé à nouveau, récemment, par H. Jentel et A. Revies, qui, sur le plan pulmonaire, ont montré la disproportion fréquente de nos phénomènes d'inflammation focale et péri-focale avec la lésion initiale et les lésions responsables de la plupart des manifestations

L'étude expérimentale de l'action anti-phlogistique des corticoïdes sur la dynamique des processus inflammatoires a été réalisée de façon complète par J.D. Rosen qui confirme les premières expérimentations pratiquées par Tashennbaum et Karovis, par H. Balg et par Spain, Glick et Haber.

Ces différents auteurs avaient montré l'action inhibitrice marquée des glyco-corticoïdes sur les phénomènes inflammatoires, s'opposant à l'action favorisante des hormones minéralo-corticoïdes et de la somato-trophique hypophysaire.

Cette action anti-inflammatoire, étudiée sur le granulome inflammatoire obtenu par abès de fixation chez le rat, serait liée pour J. Rosen à une réduction très nette de l'œdème péri-focal, par une inhibition de la vascularisation du granulome particulièrement sous l'effet de l'hydrocortisone, par une inhibition de la formation des fibroblastes et des fibres collagènes.

L'application expérimentale de la cortisone et de l'hydrocortisone aux manifestations tuberculeuses, a suscité de nombreux travaux (Spain et Holowet, Leclercq et Toupssat, Lurie, Vinner et Evans, Sheldon et Cuttler, Coste, Bourgeois et V. Dupont.) dont les résultats très discordants posent de délicats problèmes pour leur

malade et clinicien humains.

La plupart de ces auteurs ont constaté une aggravation des symptômes de la tuberculose chez les sujets traités par la cortisone. Cette aggravation a été observée chez des sujets atteints de tuberculose pulmonaire, de tuberculose osseuse, de tuberculose ganglionnaire, de tuberculose méningée, de tuberculose rénale, de tuberculose hépatique, de tuberculose intestinale, de tuberculose cutanée, de tuberculose génitale, de tuberculose oculaire, de tuberculose auriculaire, de tuberculose nasale, de tuberculose laryngée, de tuberculose trachéale, de tuberculose bronchique, de tuberculose pleurale, de tuberculose péritonéale, de tuberculose vésiculaire, de tuberculose kystique, de tuberculose nodulaire, de tuberculose fibreuse, de tuberculose calcifiée, de tuberculose chiquée, de tuberculose caséeuse, de tuberculose purulente, de tuberculose hémorragique, de tuberculose ganglionnaire, de tuberculose méningée, de tuberculose rénale, de tuberculose hépatique, de tuberculose intestinale, de tuberculose cutanée, de tuberculose génitale, de tuberculose oculaire, de tuberculose auriculaire, de tuberculose nasale, de tuberculose laryngée, de tuberculose trachéale, de tuberculose bronchique, de tuberculose pleurale, de tuberculose péritonéale, de tuberculose vésiculaire, de tuberculose kystique, de tuberculose nodulaire, de tuberculose fibreuse, de tuberculose calcifiée, de tuberculose chiquée, de tuberculose caséeuse, de tuberculose purulente, de tuberculose hémorragique.

D'autres expériences, effectuées en particulier par Boudry, Ariet et Delande, à des doses équivalentes à celles employées en clinique humaine et administrées après installation de l'allergie, ont permis à ces auteurs de conclure à l'absence d'aggravation générale ou locale, ont fait remarquer que l'action de la streptomycine associée à la cortisone se trouvait augmentée. Cette concordance expérimentale a été retrouvée sur le plan clinique de nombreuses publications rapportant des aggravations sensibles des lésions tuberculeuses chez des malades

Nous exposerons maintenant les modalités d'application
du traitement tel qu'il a été pratiqué chez
dont nous rapporterons plus loin les observations. Dans
majorité des cas (13 cas sur 15), le traitement par la
cortisone ou l'hydrocortisone, n'a été institué qu'après
couvert des antibiotiques spécifiques, le plus souvent
et rimifon associés, par voie orale aux doses habituelles
soit rimifon seul. La suite du traitement diffère selon
l'état auquel se présente l'adénopathie.

En l'état de grand érythème, nous préférons l'emploi de
la cortisone par voie générale, à des doses moyennes de
100 à 150 milligrammes par jour, pendant une durée variable
selon l'évolution des lésions.

En l'état de ramollissement ou de suppuration, nous avons
coutume de pratiquer l'évacuation préalable de contenu
contenu dans le ganglion, par expression de celui-ci,
après anesthésie superficielle soignée à ces niveaux, l'
l'aide d'un trocart. Nous faisons suivre cette
manœuvre, pratiquée deux à trois fois par semaine, de
l'injection intra-ganglionnaire d'hydrocortisone en
solution, à la dose moyenne de 25 milligrammes par in-
jection.

En l'état de fistulisation, l'application de pommade
l'hydrocortisone, déjà préconisée en Décembre 1952 par
les auteurs lyonnais, a donné d'excellents résultats.

Dans quelques cas [à dire par ex.] nous avons pu
associer ces différents éléments : ainsi nous
précisons de plusieurs ganglions à localiser
soit devant la colonne vertébrale et soit
d'une seule thérapeutique, soit avec la
guérison.

Déjà avant de nous occuper des observations
de quinze malades, précisons la grande
difficulté à régler nos étiologies et nos
divers, et nous discutons ensuite les résultats obtenus
avant d'en tirer la conclusion.

.... /

OBSERVATIONS

Observation n° I.

M. ... Yvette, -11 ans, - domiciliée le 15 avril 1954 pour adénopathie cervicale gauche évoluant depuis deux mois sans signes d'accompagnement, et convulsion des parotides rétro-mandibulaire grosse comme un œuf de pigeon, et d'un ganglion sous-maxillaire gauche du volume d'un pois, ces deux étant au stade de cruidité.

Cult-réaction négative il y a eu en fait la notion d'un contact, d'antécédents ou de porte d'entrée tuberculeux. Les examens para-cliniques montrent une auto-réaction négative, mais une intra-dermo réaction positive à 20 unités, une radiographie pulmonaire normale.

La ponction ganglionnaire ramène au peu de pus où l'on retrouve des bacilles de Koch.

Le traitement comporte tout d'abord P.A.S et Rifampine par voie orale sur doses habituelles, qui, appliquées seule pendant quarante jours, n'empêchent pas l'augmentation du volume des deux ganglions qui aboutissent au stade de fluctuation.

On pratique alors l'évacuation du contenu après scarification au vaccinostyle, suivie d'une injection intra-ganglionnaire de 25 mg d'hydrocortisone, ceci 3 fois par semaine.

Dès la deuxième semaine, on note une diminution rapide du volume des ganglions et au bout de 8 injections, il ne persiste qu'un ganglion résiduel, d'un tiers de la taille d'origine, dont les caractères restent inchangés 3 mois après.

La cicatrice de l'incision pratiquée au vaccinostyle est devenue punctiforme et sauplée.

Observation n° 8.

Do... , 19 ans. - Consulté le 6 Avril 1964 pour adénopathie cervicale gauche évoluant depuis deux mois accompagnée d'un certain degré d'asthénie et consistant d'un ganglion gros comme une amande, à la partie moyenne de la chaîne jugulaire. Ce ganglion est au stade de ramollissement et la malade signale l'existence d'une adénopathie comparable au même endroit il y a 10 ans, traitée alors par les ultra-violets. Les examens para-cliniques montrent une anti-réaction fortement positive, une image pulmonaire normale à la radiographie. La ponction ganglionnaire ramène un peu riche en polynucléaires plus ou moins altérés et ce ne retrouve pas de B.K à l'examen direct. La culture pratiquée sur milieu de Löwenstein est négative au bout d'un mois. La malade est traitée d'abord par le rimifon par voie orale pendant cinq mois, qui n'empêche pas une légère amélioration de volume du ganglion qui devient comme une noix. On pratique alors des injections locales d'hydrocortisone à la dose moyenne de 25 mg par injection, 3 fois par semaine. Après 10 injections le ganglion est gros comme une amande, dur. On envisage alors une éventuelle chirurgicale. La malade n'a pas été revue dans le service.

Observation n° 3.

Se., Jeyanli. - 3 Ans - Consulté le 24 Avril 1954 pour une adénopathie cervicale droite évoluant depuis environ une année d'accompagnement et constituée d'un ganglion sous-mavillaire gros comme un oeuf de pigeon et de plusieurs petits ganglions à la périphérie de celui-ci. On se retrouve aucun contact familial, et, aux dires de la mère, l'adénopathie serait apparue à la suite d'un rhino-pharyngite.

Les examens para-cliniques montrent une anti-réaction fortement positive, une radiographie pulmonaire normale. La ponction ganglionnaire révèle un liquide puriforme contenant des polynucléaires très lymphés. De nombreux B.A. sont retrouvés à l'évanouissement direct.

On traite alors ce jeune malade au P.A.S. à la dose de 3g par jour, et au rimifon à la dose de 100mg. par jour pendant deux mois. Ce traitement ne modifie ni le volume, ni la consistance du ganglion.

On associe alors au traitement précédent, la cortisone par voie générale à la dose de 100 mgr. par jour pendant 15 jours.

Après 5 jours de traitement, le ganglion principal a diminué de moitié et atteint le volume d'une amande. Après 10 jours de traitement le ganglion est dur et présente le volume d'une noisette.

Reçu deux mois après, le volume est inchangé et le ganglion résiduel reste isolé. On poursuit le traitement général par le P.A.S. et le rimifon.

Reçu 3 mois après, le ganglion précédent reste inchangé.

On note la présence d'un chapelet bilatéral de petits ganglions cervicaux dors. Récidive ?.

On reprend le traitement par la cortisone à la dose de 100 mgr. par jour pendant trois semaines. A la fin du traitement, les ganglions cervicaux ont à peu près tous disparu. Le ganglion initial, sous-mavillaire est de volume d'une petite noisette.

Observation n° 4.

Ca... Raymond, - 32 ans. - Consulte le 8 Juillet 1944 pour une polymacroadénopathie évoluant depuis un an environ sans autres signes d'accompagnement que des sueurs nocturnes depuis quelques temps et une légère asthénie. Cette adénopathie touche en particulier les chaînes cervicales droite et gauche, la taille moyenne étant celle d'une noisette. - les chaînes spinales et trapéziennes, les groupes axillaires (Un ganglion gros comme une noix à gauche; polymicroadénopathie à droite.). - un ganglion épitrochléen gauche. - Quelques petits ganglions inguinaux. Tous ces ganglions se présentent au stade de crudité. Les antécédents sont difficilement précisés et le malade signale l'existence d'une "tache au poulmon" en 1943. Les examens para-cliniques mettent en évidence : une cuti-réaction positive; une vitesse de sédimentation accélérée à 30-60, une adénopathie médiastinale sur la radiographie thoracique. La ponction ganglionnaire ramène un pus contenant des cellules lymphoïdes adultes en voie de lyse, des polymucléaires altérés, quelques cellules réticulaires. La recherche de B.K. par la méthode de Ziehl est positive. Le traitement entrepris comporte la prise de rifon à la dose habituelle et la cortisone par voie générale à la dose de 200 mgr. par jour pendant 17 jours, puis 100 mgr. pendant 10 jours. Dès le sixième jour du traitement, on assiste à une fonte rapide des différents groupes ganglionnaires et en particulier au niveau des chaînes cervicales (la mesure du tour de cou montre une diminution de 44 cm. à 41 cm.) 20 jours après, le tour du cou mesure 40 cm., le gros ganglion axillaire gauche est passé du volume d'une noix à celui d'une petite noisette, et les autres ganglions ont pratiquement disparu. Un mois après, les résultats sont inchangés, l'état général est excellent.

Observation n° 5.

Co....Jean-Marie.-Hans.-Consulte le 2 Août 1954 pour une adénopathie cervicale gauche évoluant depuis les 30 ans, sans signes d'accompagnement, cette adénopathie est constituée d'un ganglion à la partie supérieure de la veine jugulaire, de volume d'un œuf de pigeon, et siège de ramollissement, et l'examen retrouve une micropolyadénopathie axillaire et inguinale.

La séro-réaction est positive depuis 18 mois et on note l'absence de contact ou de porte d'entrée tuberculeuse. Les examens para-oligiques mettent en évidence une séro-réaction fortement positive, une image thoracique normale à la radioscopie. La ponction ganglionnaire revèle un pus orbeux où l'examen retrouve du cadavre de rares polynucéaires peu altérés, et de nombreux E.H.

Le traitement institué en Avril 1954 comportait la prise de 3 comprimés de rifonon chaque jour.

En Août est commencé le traitement par la cortisone par voie générale à la dose de 100 mgr. par jour -et, l'hydrocortisone en injection intra-ganglionnaire de 25 mgr. trois fois par semaine.

Après 15 jours de ce traitement, le ganglion jugulaire diminue de moitié.

Le traitement est poursuivi pendant 15 jours au début du mois de Septembre : on observe un ramollissement du ganglion et constitution d'une phlyctène qui oblige à pratiquer une incision au vaccinostyle et le drainage du ganglion.

Cicatrisation rapide, sans séquelle cutanée notable sous l'effet de la pommade à l'hydrocortisone.

En Octobre, le ganglion précédent est ferme, de la grosseur d'un petit haricot mais on note au dessus de lui l'apparition d'un gros ganglion de la taille d'une noix.

On donne alors 200 mgr. par jour de cortisone pendant 8 jours, qui ne modifie pas le volume du ganglion. On

arrête le traitement par la cortisone et on donne du B.P.A.S et rifonon par voie buccale pendant trois mois.

Le malade revu le 25 Janvier présente une poussée ganglionnaire avec péri-adénite importante comblant la région sous-angulo-mavillaire et sous-sterno-mastoïdienne gauche.

On traite alors le malade par la cortisone par voie générale à la dose de 150 mgr. par jour pendant un mois.

Après le traitement le volume de la masse ganglionnaire a nettement régressé. Il persiste 2 à 3 ganglions de la taille d'une amande environ.

Observation n° 6

Fo... Gisèle - 32 ans - Consulte le 17 juillet 1954 pour une adénopathie sous-angulo-mavillaire droite évoluant depuis 3 mois sans signes d'accompagnement. Cette adénopathie est constituée d'un ganglion du volume d'une petite noix, au niveau duquel les teguments ont une coloration normale. On note dans les antécédents une adénite au sein mammaire à l'âge de 15 ans et traitée par la radiothérapie avec guérison de suppuration ayant duré près d'un an. Les examens complémentaires montrent une cuti-réaction phlycténulaire, une radiographie pulmonaire normale, une formule sanguine normale. La ponction ganglionnaire ramène un pus où l'on note la présence de polymorphonucléaires non altérés, de rares lymphocytes et 2 amibes de type *Leishmania*. On traite alors cette maladie par le P.A.S. et le traitement par voie locale sur doses habituelles et par la corticoïde par voie générale à la dose de 300 mgr. pendant 15 jours. Dès le huitième jour du traitement, on note une diminution rapide du volume du ganglion qui devient gros comme une petite noisette, de consistance très dure. Après quinze jours de traitement le volume et la consistance restent inchangés et on pratique pour consolider le traitement une série de 5 injections intra-ganglionnaires de 10 mg. de corticoïde. On observe une légère diminution de volume du ganglion qui devient de la taille d'un haricot, dur et fibreux, que l'on peut considérer comme résiduel et non évolutif.

Observation n° 7

Go... Danielle - 10 ans - est vue à la consultation le 12 janvier 1954 pour une adénopathie cervicale droite évoluant depuis deux mois, accompagnée d'un état subfébrile persistant. Cette adénopathie est constituée d'un ganglion rétro-angulo-mavillaire droit, du volume d'une petite noix, au niveau duquel les teguments présentent un aspect inflammatoire, d'un ganglion sous-mavillaire droit de la taille d'une petite noix. On note dans les antécédents une cuti-réaction négative en février 1953, l'existence d'un état dentaire très déficient. Les examens complémentaires montrent en particulier une cuti-réaction positive, une sédimentation de la vitesse de sédimentation à 15-40, une radiographie pulmonaire normale, la ponction ganglionnaire ramène un pus.

contenant du streptococcus B.K.

La malade est d'abord traitée par le P.A.S et le zénithon par voie générale et l'évacuation du ganglion est provoquée après incision au vaccinostyle. L'enfant, revue trois mois après présente une grosse cicatrice hypertrophique ne saignant pas. L'apparition d'un ganglion cervical postérieur gros comme une amande et ramolli, fait pratiquer une série d'injections d'hydrocortisone locale. Après 12 injections ce ganglion est nettement diminué de volume (noisette) et dur. Un autre petit ganglion sous la cicatrice et dans la région sous-gentale, fait reprendre en Février le traitement par l'hydrocortisone locale et la cortisone par voie générale, à la dose de 100 mgr. par jour pendant 20 jours. Revue après ce traitement on note une légère amélioration locale, les ganglions ayant diminué de volume et semblant en voie de régression.

Observation n° 8.

Mlle. Annick. - 7 ans. - est vue à la consultation le 27 Avril 1954 pour adénopathie cervicale droite, évoluant depuis un mois environ, sans signes d'accompagnement, et constituée d'un ganglion sous-mavillaire de la taille d'une olive, et d'un ganglion rétro-angulo-mavillaire de la taille d'une noix, au stade de cradité. Cette adénopathie serait apparue à la suite d'une extraction dentaire. La cuti-réaction est positive depuis le mois de Juin 1953. Les examens complémentaires confirment la positivité de la cuti-réaction, et la ponction ganglionnaire ramène un pus lyzé où l'on ne retrouve pas de B.K à trois examens successifs, et la culture sur Losenstein reste négative. Le traitement est d'abord appliqué au ganglion rétro-angulo-mavillaire par des injections locales de riodon (5 injections) qui provoquent le ramollissement du ganglion et commandent son évacuation après incision au vaccinostyle. Le ganglion diminue considérablement de volume, mais on remarque 2 mois après le début du traitement un agrandissement important de l'orifice d'évacuation et un suintement permanent à ce niveau.

On pratique alors des applications de pommade à l'hydrocortisone et 15 jours après le fistule est cicatrisée et réduite à un orifice punctiforme. Le ganglion sous-mavillaire est traité par des injections locales d'hydrocortisone et se ramollit et après cinq injections, le ganglion, primitivement gros comme une olive, pratiquement disparaît. La malade revue 4 mois après présente un petit orifice fistuleux rétro-angulo-mavillaire cicatrisé et le ganglion se présente sous la forme d'un reliquat fibreux, ferme. Mais on note en l'absence de celui-ci l'existence d'un petit ganglion

de ... Luclyne, - 2 ans, - est vue à la consultation le 15 Août 1954, pour une adénopathie sous-angulaire gauche, de volume d'un œuf de poule, au stade d'écoulement pur. Dans les antécédents, on note une vaccination par scarification au niveau du bras gauche, à 15 jours. Les examens complémentaires sont tous négatifs. Réaction positive. La ponction ganglionnaire ne contient pas de B.K. L'adénopathie, fluctuante, évacuée au vaccinostyle et, un mois après, persiste fistule étendue, suintante, que l'on traite par l'hydrocortisone.

On note rapidement un assèchement de la fistule et diminution considérable de sa surface.

No. ... Martine, - 2 ans et demi, - est vue à la consultation le 15 Octobre 1954, pour une adénopathie sous-angulaire

gauche, constituée de deux ganglions dont l'un est fistulisé.

On traite par la fistule, la suppuration est évacuée par le vaccinostyle, la fistule se ferme. On applique sur la fistule la pommade à l'hydrocortisone qui provoque la fistulisation du ganglion supérieur.

On traite le ganglion par la terzacycline pendant quelques jours, puis l'hydrocortisone en injection intra-ganglionnaires, à raison de 100 mg injections par semaine. On applique sur la fistule

la pommade à l'hydrocortisone. Après 7 injections d'hydrocortisone, on assiste à un arrêt complet de la suppuration et la fistule diminue notablement de surface. Après 7 nouvelles injections, le ganglion fistulisé est dur, volume d'une petite noisette, la fistule ne présente qu'un orifice punctiforme, asséché, et le ganglion se jacent a diminué de moitié, atteignant le volume d'un On arrête alors le traitement local et, 15 jours plus tard, on note une fermeture complète de la fistule ; le ganglion reste inchangé. Un mois après, excellent résultat.

Observation n° II.

Pr... Yvonne, - âgée de 52 ans, - Consulte le 10 Mars 1954 pour une adénopathie sous-angulo-mandibulaire gauche, évoluant depuis deux mois. La tumeur est...

Le diagnostic se conclut à une amygdalite. La ponction ganglionnaire pratiquée lors de la première consultation montre la présence de B.K. dans le pus retiré. On conseille alors l'excision chirurgicale de ce ganglion isolée qui est pratiquée à la fin du mois de Mars : suite très favorable jusqu'en Décembre 1954 où la malade revient consulter devant l'apparition de deux ganglions rétro-mandibulaires droit, de volume d'une noix. La ponction ganglionnaire met en évidence de très nombreux B.K.

On institue alors un traitement par la cortisone par voie générale à la dose de 100 mg/jour par qui provoque après une quinzaine de jours une diminution de moitié du volume des ganglions. On pratique alors une série de 12 injections intra-ganglionnaires d'hydrocortisone qui ne modifient pas le volume des masses ganglionnaires. La malade revient consulter un mois après la fin du traitement local et présente le 26 Février 1955 un orifice fistulaire saillant au niveau d'un des ganglions rétro-mandibulaires. Par ailleurs l'adénopathie n'a pas augmenté de volume. On reprend alors le traitement par l'hydrocortisone locale à raison de trois injections hebdomadaires et le 8 Mars 1955 l'écoulement fistulaire est cessé et la masse ganglionnaire a retrouvé son volume. Après un mois de traitement la malade est revue à la consultation et l'on note la cicatrisation de la fistule qui est presque entièrement cicatrisée et une diminution de moitié de la masse ganglionnaire.

Observation n° I2.

Pr... Annie, - âgée de 36 ans, - vient consulter le 25 Novembre 1954 pour une adénopathie cervicale gauche.

évoluant sans signes d'absorption ont permis à deux
 reprises. Cette évolution a été caractérisée par un ganglion
 dans la région électro-mandibulaire, du volume d'une noix
 fluctuant et d'un ganglion rétro-mandibulaire dur et
 douloureux à la palpation. La cuti-réaction positive
 depuis 1949 est pratiquée à nouveau et se révèle
 polyséculaire la ferveur sanguine et la numération
 globulaire montrent une leucocytose à 8,500 et une
 polyesthésie à 80 % la vitesse de sédimentation est
 normale et la radiographie pulmonaire montre l'inté-
 grité du parenchyme pulmonaire et l'absence d'adénopathie
 médiastinale. La ponction ganglionnaire pratiquée à 2
 reprises retire au pus où l'examen retrouve de nombreux
 polymorphes altérés quelques lymphocytes et pas de
 S.T. La culture sur gélose montre l'absence de germes
 bactériels et la culture sur l'œuf de souris est négative.
 Après un traitement une semaine par la terramycine à la
 dose journalière de 500 mg on observe une légère
 diminution de volume des ganglions et on pratique une
 série d'injections intra-ganglionnaires d'hydrocortisone
 à raison de deux injections de 25 mgr. par semaine
 pendant six semaines. Après 8 injections, le ganglion
 supérieur est passé du volume d'une noix à celui d'une
 noisette dure et indolore, le ganglion inférieur ne
 s'est pas modifié. Après 10 injections, le ganglion
 supérieur a pratiquement disparu, et le ganglion inférieur
 a nettement diminué de volume étant gros à peine comme
 une noisette. Le traitement est alors arrêté et la
 malade considérée comme guérie.

Observation n° 13.

Ro... Monique. - Femme - est vue à la consultation le
 9 Juin 1954 et présente une adénopathie rétro-mandibulaire
 gauche, du volume d'une noix, dure et indolore, évoluant
 depuis une quinzaine de jours environ.
 On note une certaine asthénie et un état sub-fébrile
 persistant depuis le début de l'affection. La cuti-
 réaction pratiquée à cette date étant douteuse on
 pratique une intra-derme réaction à 50 unités qui se
 révèle positive. La vitesse de sédimentation est
 accélérée à 60-80, la radiographie pulmonaire est normale.
 La ponction ganglionnaire ne retire pas de pus et
 l'histologie est celle d'une adénopathie inflammatoire

banale, comportant 50 % de lymphocytes et 45 % de polynucléaires, le frottis est négatif.
Le malade est traité par le P.A. et le rifampin aux doses habituelles par voie orale associée à la cortisone par voie générale à la dose de 150 mgr. par jour pendant 4 jours, puis 100 mgr. par jour pendant la même durée. Dès le quatrième jour on note une diminution de moitié du volume de la masse ganglionnaire et au huitième jour il ne persiste plus qu'un petit nœud dur, fibreux et indolore. On continue le traitement par les antibiotiques pendant 2 mois encore et le malade revient après ce laps de temps présentant un état général florissant et localisant à la persistance d'un petit nœud fibreux résiduel qui autorise à considérer le malade comme guéri.

Observation n° 14.

Pa... Chantal, 3 ans, est vue à la consultation le 7 Janvier 1955 et présente une adénopathie cervicale bilatérale prédominante dans la région sous-maillaire droite où l'on retrouve un ganglion de volume d'une noix fistulisé et au dessus de lui un ganglion gros comme une noisette. On retrouve à gauche un petit ganglion carotidien. Cette adénopathie a été constatée rapidement en Octobre 1954, accompagnée d'une poussée fébrile à 38-39°C et la cuti-réaction pratiquée à cette date était positive (Cuti-réaction négative en Avril 1954).
Le malade a alors été traité en ville par le rifampin, puis par la pénicilline et la streptomycine (15 injections en tout) et a noté une série de 7 ponctions ganglionnaires avec injections locales de rifampin et de streptomycine. Ce traitement a abouti au début du mois de novembre à la fistulisation du ganglion sous-maillaire droit, et c'est alors que le malade est vu dans le service au début du mois de Janvier. On pratique alors une série d'injections intraganglionnaires d'hydrocortisone à raison de 1 injection par semaine (11 injections en tout). Le traitement général par le rifampin étant poursuivi. Dès la troisième injection, on note une diminution sensible du volume des ganglions et la fistule commence à cicatriser. Après 11 injections le ganglion principal est devenu gros comme un pois, dur et indolore, la fistule étant en voie de cicatrisation. Quinze jours après l'arrêt du traitement la fistule est fermée, sèche et l'adénopathie n'est plus visible. Le malade est revu le 20 Février 1955 et on note la reprise d'un léger écoulement purulent par la fistule. On recommence le traitement

Ce... Georges, - 8 ans, - est vu à la consultation le 14 Janvier 1955 pour une adénopathie mastoïdienne droite, révélée depuis un mois environ. Cette adénopathie est de nature clinique le crâne et l'anneau rétroauriculaire quelques petites ganglions dans le long de la chaîne carotidienne. La dermatisation cuti-réaction pratiquée au mois d'Octobre 1954 avait été négative et il faut noter qu'à cette époque le visage du jeune enfant avait présenté une adénopathie tuberculeuse de la région occipitale, traitée chirurgicalement.

La cuti-réaction pratiquée le 14 Janvier 1955 se révèle polytonale et la ponction ganglionnaire réalisée en parallèle dans lequel l'examen direct ne retrouve ni germe ni B.C. La vitesse de sédimentation est accélérée à 44-50 et la radiographie pulmonaire est normale. L'examen C.T.T. et électrologique montrent l'absence de chancres d'impaction bucco-pharyngée.

Le traitement mis en jeu dès le 21 Janvier 1955 comporte l'administration de rifampine et de C.I.S. avec un antibiotique et l'injection intra-ganglionnaire d'hydropurine à raison de 2 injections de 20 mgr par semaine. Ce traitement provoque l'extinction de cette adénopathie et la disparition du ganglion principal. Le ganglion principal disparaît et après 12 injections le ganglion principal a disparu. Le traitement est arrêté et la guérison est obtenue. Le traitement est donc efficace et peut être considéré comme guéri.

RÉSULTATS ET DISCUSSION DES OBSERVATIONS

Avant d'aborder la discussion interprétative des observations que nous venons de rapporter, nous rappellerons à l'honneur de celles-ci que la positivité des réactions sanguinolentes est en règle dans la tuberculose ganglionnaire, que l'épreuve clinique et radiologique péthoracique dans la quasi-totalité des cas et l'intégrité paracymbasiale du poulmon, que le diagnostic pourra souvent être confirmé par les données de la réaction ganglionnaire soit par la présence de bacilles de Koch, soit par l'aspect de l'adénogranulome dans certains cas.

L'appréciation des résultats est difficile à établir. Les critères de guérison étant nuls avant tout sur l'évolution locale des lésions ganglionnaires, on peut parler de guérison devant la constitution d'un ganglion résiduel fibreux, nodulaire, voire même devant la disparition complète du ganglion initial, ce qui est beaucoup plus rare.

On peut résumer, relative pour un ganglion limité initial, ce qui est plus sur le plan général de l'affection thoracique, on assiste plus ou moins long après la guérison de l'adénogranulome, on assiste à l'apparition d'une nouvelle adénopathie atteignant un autre groupe ganglionnaire, ou, avec régularité plus ou moins importante

peut se présenter au cours du traitement par la cortisone.
On pourra parler d'aggravation devant la diminution de
volume du ganglion initial, la disparition des phénomènes
de péri-œdème, ou des lésions de fistulisation. Dans
ces conditions, il nous est permis de considérer 10 sur
15 de nos malades comme guéris. Les 5 malades restants
ont été aggravés par le traitement ou ne peuvent être
considérés comme guéris en raison de l'apparition d'une
nouvelle adénopathie trop récemment traitée pour que
nous puissions juger du résultat obtenu.

Dans la discussion thérapeutique des observations, nous
diviserons celles-ci en trois groupes selon que le
traitement appliqué aura été l'hydrocortisone employée
seule en injection, la cortisone par voie générale et,
enfin, l'association des deux méthodes.

Le traitement par l'hydrocortisone en injection intra-
ganglionnaire appliqué selon les modalités exposées
précédemment, a été réservé aux formes pauci-ganglion-
naires corporelles et à des ganglions se présentant
soit au stade de ramollissement (observations n° 1-2-13
et 15) soit au stade de fistulisation (observations
n° 8-10 et 14). Les injections pratiquées au nombre total
de 10 environ en moyenne à raison de 2 ou 3 par semaine
font que le traitement local a été prolongé entre 3 et
5 semaines, durée relativement brève, si on le compare à
celle des autres méthodes thérapeutiques. La cortisone
a été pratiquée chez tous les malades sans aucun accident local.

ou général a étant à rapporter et sous réserves encore
ici sur l'importance de la technique avec laquelle doivent
être pratiquées les injections, dans les formes nos
distinctions on peut observer dans la plupart des cas
une diminution rapide du volume de l'adénopathie dès les
premières injections et une modification nette de la
consistance du ganglion qui devient dur et fibré. Dans
certains cas cette évolution a fait disparaître l'intérêt
d'une série chirurgicale ou ganglion résiduel pour
éviter une évolution possible, sur la plan cutané,
l'origine d'injection ou produit de bonne ligne le plus
souvent qu'à une petite cicatrice punctiforme qui
disparaît par la suite.

Dans les formes fistulisées, on associe au traitement par
l'hydrocortisone l'application de la pommade à l'hydro-
cortisone sur la fistule ou l'ulcération cutanée, et on
observe l'arrêt rapide de l'écoulement, un assèchement de
la fistule qui s'oblitére en laissant une cicatrice
souple, non hypertrophique. L'effet de la pommade à
l'hydrocortisone a été particulièrement net dans l'obser-
vation n° 5, la fistule ayant été traitée que par celle-ci.
Dans l'ensemble des cas traités, le résultat peut
être considéré comme très favorable, tant par sa rapidité
que par son efficacité (4 guérisons complètes).
L'apparition d'un petit ganglion au-dessous du ganglion
initialement traité avec succès n'a eu lieu que dans l'obser-
vation n° 5, n'a pas permis de parler de guérison complète dans

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

22 Mars

La cortisone administrée par voie générale, sous forme de suspensions aqueuses, a été appliquée à trois de nos malades (observations n° 3-4 et 13) présentant des adénopathies au stade de crudité clinique, dans un des cas une polymacroadénopathie étendue à toutes les aires ganglionnaires (observation n° 4).

Donnée, avec les précautions d'usage, à la dose moyenne de 100 mgr. par jour pendant une durée moyenne de 13 jours, la cortisone n'a donné lieu à aucun trouble, local ou général. La régression de l'affection au traitement a été particulièrement spectaculaire dans deux cas (n° 3 et n° 13), le volume initial du ganglion ayant diminué de moitié après administration de 900 milligrammes de cortisone, pour aboutir en fin de traitement à un petit noyau fibreux résiduel dont les caractères restaient inchangés trois mois après l'arrêt du traitement. L'effacement se traduit également sur le plan biologique en particulier par la vitesse de sédimentation qui est revenue normale après un séjour de traitement. La rapidité d'action de la cortisone a pu être notée dans l'observation n° 4, où le malade atteint de polyadénopathie diffuse, a vu diminuer de façon considérable le volume des adénopathies cervicales en particulier, le volume ayant diminué de 3 cm dans ce laps de temps. L'action de la cortisone dans le cas de ces adénopathies

au stade de crudité clinique semble donc être particulièrement intéressante par la courte durée du traitement et par l'absence de toute manœuvre entraînant des lésions cutanées au niveau des masses ganglionnaires.

L'association des voies d'administration locale et générale a pu être réalisée dans quatre cas.

Dans l'un des cas (observation n° 4), l'hydrocortisone n'a été employée que pour consolider les résultats obtenus par la cortisone.

Dans deux autres cas (observations n° 5 et 7), l'association des deux voies d'administration a été commandée par l'évolution vers la fistulisation de certains ganglions et par la coexistence d'adénopathies multiples, apparues parfois au cours du traitement ou après arrêt de celui-ci.

La cortisone ne semble pas se faire à l'abri de récidives, ou plus exactement de nouvelles poussées dans un autre territoire ganglionnaire, mais il faut remarquer dans ce cas que la reprise du traitement cortisonique freine l'évolution des nouveaux ganglions dont le volume reste souvent modéré.

Dans ce dernier groupe d'observations, l'action du traitement a été moins démonstrative que dans les groupes précédents, l'évolution se faisant par poussées successives apparaissant après arrêt du traitement et obligeant à de nouvelles cures, mais ne se peut reconnaître

peut considérer ces cas comme vraiment des aggravations
de la maladie, par les nouvelles poussées s'ensuyvant
jusqu'à la manifestation d'une ou multiple, et que
l'élémentaire s'ensuive que l'on rencontre dans les cas
aggravés par les antituberculeux et, ce plus, l'état général
des lors des poussées, ne présente jamais d'altération
grave.

=====

.... /

RESUME ET CONCLUSION

Le traitement de la tuberculose ganglionnaire externe offre, comme nous venons de le voir, de multiples ressources thérapeutiques, multiplicité qui porte en elle-même la preuve d'une relative et inconstante efficacité qui ne rend que plus difficile le choix de la thérapeutique.

Le traitement médical proprement dit, se basant sur l'usage des antibiotiques et de sulfamides, associés aux dérivés salicylés, est à l'heure actuelle la méthode thérapeutique qui constitue, du reste aujourd'hui, plus un appoint qu'une méthode thérapeutique. Certaines médications, telle l'hypérite à l'azote, sont d'un maniement trop délicat pour valoir dans la pratique courante.

Le traitement physico-chimique comprenant la Roentgenthérapie associée ou non aux rayons ultraviolets, ne pourra être conseillé qu'avec la certitude d'une application respectant les règles de la sécurité. Les adénites de constitution récente et d'évolution torpide.

Le traitement chirurgical, réservé aux tumeurs étendues, mais sera conseillé plutôt dans les formes mono ou pauci-ganglionnaires, bien limitées, au stade de

crédité clinique, l'opération étant pratiquée sous couvert
des antibiotiques spécifiques et sans drainage post-
opératoire. Seule une infection caractérisée des
amygdales et des adénoïdes sera une indication à
l'amygdalectomie ou l'adénoïdectomie avant l'entrée
ganglionnaire.

Le traitement par les antibiotiques spécifiques ne sera
pas appliqué systématiquement, tant en raison de l'in-
suffisance de son action que de la possibilité d'aggra-
vation de l'affection, surtout, semble-t-il, sous l'effet
de l'association streptomycine-rimifon. On réservera
leur emploi aux formes malignes et infectantes où
l'abscessus purulent prend l'extension locale, aux formes
prolongées à foyer satellite, aux formes polymyxieuses
et multifistuleuses.

L'emploi de la corticoïde est de l'adrenocorticoïde qui sera
avant tout plus spécialement d'après guises d'examens
cliniques, pourra apporter un apport important dans le
traitement de l'adénite tuberculeuse. Tous les stades
de l'affection semblent en effet bénéficier de corticoïdes
peu ou variant selon le stade envisagé, à la période
de crudité on préférera l'emploi de la corticoïde par
voie générale à des doses moyennes de 50 à 100 mg/jour
par jour, certaines fois avec les précautions d'usage au
stade de ramollissement et de fluctuation, une évacuation

ou cancer ganglionnaire est pratiqué après isolation
et radiothérapie, suivie de l'injection intra-ganglionnaire
d'hydrocortisone en solution à la dose moyenne de 20
milligrammes, deux à trois fois par semaine. Au stade de
récidive, la poursuite à l'hydrocortisone accélère la
guérison locale.

Le traitement ainsi conduit et associé le plus souvent
aux antibiotiques spécifiques par voie générale, a donné
lieu à une guérison clinique complète et paraissant
stable dans II cas sur III. La guérison s'affirme sur le
plan ganglionnaire par la présence d'un petit noyau
résiduel, fibreux, dur et indolore et sur le plan cutané
par l'absence de cicatrices inesthétiques, les fistules
elles-mêmes cicatrisant de façon favorable.

D'autre part, le traitement est rapide, d'une durée moyenne
de trois à cinq semaines, et n'a donné lieu à aucune
intolérance ni à aucun accident. Nous insistons encore
à ce sujet sur l'importance de la surveillance médicale
au cours du traitement tant local que général.

Enfin, dans les cas qui semblent ne pas avoir abouti à la
guérison, il faut noter qu'une amélioration sensible de
l'état local ganglionnaire et cutané a été observée, et
que, si des poussées évolutives se sont produites après
arrêt du traitement, ce fut toujours sur un mode discret.

et réagissant bien au même traitement cortisonique.
La cortisone et l'hydrocortisone semblent donc présenter
une action efficace, rapide, sans risques notables dans
certaines modalités d'application, qui justifie leur
emploi dans le traitement de la tuberculose ganglionnaire
externe.

Paris, le 18 Avril 1955.

DOCTEUR Julien MARIE
Professeur

Vu le doyen :
signé : L. Binet.

Vu et permis d'imprimer
Le Recteur
de l'Académie de Paris :
signé : illisible

BIBLIOGRAPHIE

Généralités et traitements classiques.

- A. Dufour et J. Arna.- Traité de physiologie otologique.
Edition Vigot frères.1953.
- Baton et Hamon.- Biologie de la tuberculose latente.
Revue du Praticien.1952.2.32.p.2121.
- A. Brenel.- Adénopathies cervicales tuberculeuses.
Gazette médicale de France,1953,2 Janvier.F.192
- A.Richard.- Adénopathies cervicales tuberculeuses.
Revue de tuberculose.I.IV.Mai.Juin 1941
p.242-301.
- Ol Choffel.- Traitement des adénites tuberculeuses.
Bulletin médical.Décembre 1952.
- H.Bailey.- Tuberculous cervical adenitis
The Lancet.Février 1948.p.313.
- J.Ross.- Tuberculous disease of the cervical lymph glands
Edinburgh Med.J. LV.Avril 1953.p.184.
- Svensson and Snall.- Tuberculosis of cervical lymph nodes
Pediatrics 10 n°2 Août 1952.
- Dowd C.H.- Tuberculosis of cervical lymphatics.
IANA.87.499.-1918.
- Gaté, L'ayoux.- Adénopathies tub.chez l'adulte jeune et primo-infect.pharyngée.
Journal Médecine Lyon.5 Juillet 1943.p.379.
- H.Vetter.- Schweizerische medizinischewochenschrift
Bâle 84.8 (20/2/1954.p.237.260.)
Tub.des amygdales et lymphores tub.du cou.
- P.Barthelemy.- Etude comparative de l'action de la physiothérapie et de la radiologie dans le traitement de l'adénite tub.
Dipl.Radiol.1951.
- J.Belot.-F.Lepennetier.- Traitement des adénopathies tub. par les agents physiques
Rev.Actinologie IV p.113.-1928

A.J.Bonan.- Roentgentherapie et U.V dans la tub.scl.
Thèse Paris 1943 n° 383.

F.Lepennetier.- Place de la roentgentherapie dans le
trait.des adénites cervic.
Revue med.fr. XXIII Juillet 1942 p.179-
190.

J.Henri.- Les rayons U.V dans le trait.des adénites
Thèse Paris 1928.

J.Jacq.G.F.Ghest.- Roentgentherapie concentrée dans la
lymphadénite tub.cervicale.
Am.Journ.med.Sc. CXVII.Juin 1949
p.632-636.

P.Chevallier.- Quelques maladies du sang traitées par le
gaz moutarde.
Le Sang n°2 -1948.

J.Besançon.- Les ypérites à l'azote en thérapeutique.
Les medicat.du jour. 1949.

J.Alexandrowicz.- Curative properties of nitrogen mustard
Le Sang 1950. n° 4.

Les antibiotiques

J.Sallard.- Traitement des adénites tub par l'huile de
Chaulmoogra.
Thèse Paris 1952 n° 1088.

Kerker.- Indicat,resultats et accid.de la streptocycline.
Presse médicale 5.12.1947.

G.Maini.- Tr.local de la lymphodénite tub.par la strepto.
In Abstracts of world med. 1952, 12.8-p.4000

Chibneff.-Tr.des adénites tub.par la strepto locale.
Thèse Paris 1951 n° 588.

A.Jevriessen.- Emploi de la strepto dans la tub.gangl.pulm
de l'enfant.
Acta Tub.Belgio.1952. 43.p.371-376.

Imbert.Chevallier.Bernardie.- Possibilités et limites de
trait.des ad.tub.par les
antibiotiques.
Journal medic.de Lyon.3/54

P.Blot.- Action comparative des divers traits.des adénites
de l'adulte.
Thèse Paris 1953 n° 998.

Die Medizinische 1954 38 p.1277-1280. Tr;de la tub.gsl.
superfic.par l'INH.

A.Gaspourey.- IM et adénopathie- tub.Tr. local
Concours médical 1953.43 p.3552.

Morris and Potter Evans.- Tr.of tub.cervical anastomosis
with para-amino-sal-ac.
The Lancet 1951 260 p.6666.

La cortisone

Tariel.- ACTH et cortisone dans la tuberculose.
Suppl.REV.Praticien 1951 6 p.133-137.

A.W.Capon.- ACTH et cortisone dans la tub.
Canada med.assoc. 1952.67/I p.46.

P.Freour et Coll.- ACTH et cortisone ont-elles un rôle
à jouer dans le trait.de la tub.
J.de Med.de Bordeaux et S.O Oct.1954

J.Baudot-J.Arlet.-Cortisone ACTH et tuberculose.
Rev.de rhumato. 1953 8/9.p. 600-617

Coste,P.Fourgeois et Coll.- Action cortisone et ACTH dans
la tub.exp.
Rev.tub. 15 1951 p.698.

" " " " " " " " .- Action cortisone et ACTH
Rev.tub.1952.16 p. 919.

Vie Dupont.- ACTH et cortisone chez les tuberculeux
So.fr.de tub. 12.6.1954

Spain and Molonat.- Effects of cortisone in the develop.
of tub.lesions in guinea pigs
Am.REV.of.tub. 67.337 1950

Lemaistre et Dupérot.- Evolution des lésions tub.de cœcum
avec ACTH et cortisone.
Am.rev.of tub.1951 64 3 p.295

Winnar Evans.- Exp.tub.in cortisone treated guinea pigs
Tubercule. 1952 33 p.239-242

Sheldon,Cummings,Evans.- Proceed of the soc.for exp.med.
and therap. 1950.75 p.616

Lubert,Chevallier.- Traitement des ganglions tub.pour la

Réunion lyonnaise de Pédiatrie. 12/12/1953

Sors.-Trocmé.- Traitement des tub.séruses par ACTH et cortisone.
Rev.tub. 1954 n° 6.p.522.

M.Pestel -A.Ravina.- La part des processus inflammatoires non spécifiques dans l'évolut. des lés. tub.
Pr.méd. 19 Mai 1954

J.D.Ronani.- Contribution à l'étude de l'action des corticoïdes anti-phlogistiques dans la dynamique des processus inflammatoires.
Semaine H.P 26 Mai 1954 p. 2143

Spain-Molomut-Haber.- Effect of cortisone on the formation of granulat tissue on mice.
Am.J.of Path. 1950 26 p.780

Taubenhaus.- Further studies of the hormonal regulation of granulat tissue formation.
Acta edit(Montréal) 1953 p.97

Fontan et Coll.- Erythèmes nouveau traités par la cortisone
Journal médic.Bordeaux. 12/12 1954.p.1389

=====

